

EXPOSÉ SOMMAIRE
DES
TITRES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DE
M. CAMILLE LEBLANC

VÉTÉRINAIRE A PARIS
MEMBRE TITULAIRE DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE, DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
ET DE LA SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE
VÉTÉRINAIRE ATTACHÉ A LA PRÉFECTURE DE POLICE

CANDIDAT A LA PLACE VACANTE

DANS
LA SECTION DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

PARIS
TYPOGRAPHIE DE RENOU ET MAULDE
105, RUE DE SIVOLI, 105

1872





EXPOSÉ SOMMAIRE
DES
TITRES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DE
M. Camille LEBLANC
VÉTÉRINAIRE A PARIS

Admis au concours à l'École vétérinaire d'Alfort, en 1844.

A obtenu, en 1845, le deuxième accessit de la première année d'études.

Diplôme de vétérinaire, en 1848.

Nommé, en 1849, vétérinaire adjoint de la Préfecture de police.

Élu, en 1849, membre titulaire de la Société de biologie.

Élu, en 1856, membre titulaire de la Société centrale de médecine vétérinaire.

Il a exercé, depuis 1848, la médecine vétérinaire à Paris; il a été attaché à diverses administrations d'omnibus, à la Compagnie des voitures de Paris, au Jardin zoologique d'acclimatation et au Muséum d'histoire naturelle, comme, vétérinaire et comme conseil au point de vue de l'hygiène des animaux.

Il a été chargé, comme vétérinaire de la Préfecture, d'appliquer, dans le département de la Seine, les règlements d'hygiène et de police sanitaire, et a fait divers rapports sur ces deux parties de la science vétérinaire.

Depuis 1857, il est collaborateur du *Recueil de médecine vétérinaire*.

Depuis 1861, il est rédacteur-adjoint du journal la *Clinique vétérinaire*.

Nommé, en 1866, secrétaire annuel de la Société centrale de médecine vétérinaire; réélu en 1867, 1868, 1869 et 1871.

Élu, en 1869, membre titulaire de la Société de thérapeutique.

Nommé, en 1870, membre de la commission des épizooties.

Décoré le 9 août 1870.

Nommé, en 1871, membre de la commission du typhus.

Nommé, en 1871, membre de la commission des valeurs au ministère de l'agriculture.

Nommé, en 1871, vétérinaire de la Préfecture de police.

PUBLICATIONS ET RAPPORTS.

Examen anatomique de l'affection connue sous le nom d'eaux-aux-jambes. (Comptes-rendus de la Société de biologie, 1849, p. 69.)

Note sur l'acare des follicules. (Mémoires de la Société de biologie, 1849, p. 91.)

Note sur une tumeur cancéreuse du chien. (Mémoires de la Société de biologie, 1849, p. 165.)

Fracture du scapulum chez le cheval, avec fausse articulation. (Mémoires de la Société de biologie, 1840, p. 175.)

La fracture du scapulum chez le cheval est un cas très-rare dans la science vétérinaire; il en est de même de la fausse articulation établie entre la face interne de cet os et la tête de l'humérus.

Kyste osseux du maxillaire inférieur chez le cheval. (Mémoires de la Société de biologie, 1850, p. 35.)

Mémoires sur l'action physiologique de la vérratine (en collaboration avec M. Fairé), présenté à l'Académie des sciences dans la séance du 18 décembre 1854; publié dans les Mémoires de la Société de biologie, 1854.

Ce travail est le résultat d'expériences nombreuses faites sur le cheval et le chien. Il prouve que la vérratine exerce trois actions distinctes sur l'organisme animal :

- 1° Une action bien marquée sur le tube digestif;
- 2° Une action sur les organes de la circulation et de la respiration;
- 3° Une action sur le système nerveux et les muscles de la vie animale.

A la première période, cet agent médicamenteux porte son action sur le tube

digestif et détermine l'augmentation de la sensibilité, de la contractilité et des sécrétions; la première se traduit par des coliques et le ténésme rectal; la seconde par l'augmentation des mouvements péristaltiques, et la troisième par la grande abondance du liquide sécrété par les glandes salivaires et par les follicules intestinaux.

La deuxième période est signalée par l'abattement, la prostration des forces et le ralentissement de la circulation.

A la troisième période, apparaissent les accidents tétaniques avec augmentation de la sensibilité, d'abord courts et séparés par de légers intervalles; puis ces accès se rapprochent et la mort survient.

A l'autopsie on trouve des traces complètes d'asphyxie.

La véstrine doit être rangée parmi les excitants du système musculaire avec cette différence qu'elle ralentit la circulation et qu'elle fait contracter le tube intestinal.

On peut l'employer : 1° comme purgatif violent dans le cas d'obstruction du gros intestin par des matières fécales, ou pelotes stercorales et contre le vertige abdominal du cheval; 2° comme sternutatoire, vu son action énergique sur la muqueuse nasale; 3° comme hyposthénisant, dans le cas de rhumatisme articulaire; 4° comme agissant sur le système nerveux de la vie animale dans les névralgies ou les névroses, comme la chorée, le tétanos.

Chez le chien, la dose médicamenteuse varie de 5 à 8 centigrammes; la dose toxique, de 15 à 20 centigrammes.

Chez le cheval, la dose médicamenteuse est de 50 centigrammes à 1 gramme; la dose toxique, de 3 grammes.

Par suite, la dose toxique doit être pour l'homme de 75 à 80 centigrammes, et la dose médicamenteuse de 15 à 20 centigrammes.

En injectant par le rectum, chez le chien, on obtient une purgation violente avec 5 centigrammes, et chez le cheval le même effet se produit avec 1 gramme.

Introduite sous la peau, la véstrine détermine la mort chez le chien, à la dose de 25 centigrammes; chez le cheval, la dose de 1 gramme produit une purgation et le ralentissement du pouls.

Note sur l'existence d'œufs d'entozoaires dans la vésicule biliaire des moutons. (Mémoires de la Société de biologie, 1856, p. 195.) (Falvre et C. Leblanc.)

Fracture du corail chez une jument ; séparation de la cavité cotyloïde en trois fragments. (Recueil de médecine vétérinaire, 1858, p. 235.)

Remarques sur la congestion et l'apoplexie du foie chez le cheval. (Recueil de médecine vétérinaire, 1859, p. 733 ; *idem* 1860, p. 101.)

Ce mémoire renferme vingt-huit observations de congestion ou d'apoplexie du foie dont huit ont été recueillies par l'auteur ; il traite d'un point de pathologie peu connu en médecine vétérinaire et prouve :

1° Que les affections du foie chez le cheval, et notamment la congestion, l'apoplexie et la rupture du foie, sont moins rares que le nombre des observations publiées porterait à le penser ;

2° Qu'il existe différentes complications dont les symptômes plus connus que ceux de la maladie du foie peuvent obscurcir et dissimuler les signes propres à cette affection ;

3° Que les causes prédisposantes de la congestion hépatique sont la pléthore, l'obésité et le défaut d'exercice ;

4° Que les symptômes communs à ces deux formes peuvent être distingués de ceux qui sont particuliers aux congestions pulmonaires, intestinales ou à une apoplexie de la rate ;

5° Qu'il y a deux espèces de congestions, une congestion violente et une congestion lente.

6° Que la guérison peut être obtenue par un traitement énergique, mais que le régime est très-important à faire observer ; que les soins à donner pendant la convalescence sont minutieux et que les rechutes sont mortelles alors qu'on néglige ces soins et qu'on met trop tôt les animaux au travail.

Note sur l'inoculation de la péripneumonie casudative des bêtes bovines, lue à la Société centrale de médecine vétérinaire. (Recueil de médecine vétérinaire, 1862, p. 83-94.)

Dans ce travail, on insiste sur la variabilité des résultats produits par l'introduction dans l'économie du liquide extrait des poumons malades, et sur la différence des résultats obtenus par les divers expérimentateurs.

Il est prouvé que l'on ne peut parvenir, en inoculant ce soi-disant virus, à produire aucun des symptômes de la maladie inoculée ; et l'on établit la différence

capitale qui existe entre ces inoculations et celles qu'on pratique dans d'autres cas (soit la clavelée, la variole, la vaccine, le charbon, la morve, la rage, etc.).

Après avoir fait remarquer les dangers que présente le nouveau procédé, le mémoire appuie sur ce point que les expériences faites par des commissions savantes n'ont donné que des résultats douteux, bien étonnants en présence des succès merveilleux obtenus par les partisans de l'inoculation préventive.

Note sur l'emploi de l'onguent égyptiac dans le cas de plaies des articulations et des gaines synoviales tendineuses. (Clinique vétérinaire de 1862, p. 334.)

Mémoire contenant cinq observations d'ouvertures articulaires ou de plaies pénétrantes des gaines tendineuses; sur ces cinq cas on compte deux insuccès, tous deux dans le cas de plaie articulaire; et trois succès, l'un relatif à un fait d'ouverture articulaire, les deux autres dans le cas d'ouverture des gaines synoviales.

Le travail conclut que l'emploi de l'onguent égyptiac donne des résultats très-favorables lorsqu'il s'agit de plaies des gaines tendineuses, mais qu'on a exagéré sa vertu lorsqu'on doit traiter des ouvertures articulaires.

Maladie des chiens. (Article publié dans le *Dictionnaire de médecine vétérinaire* de MM. Bouley et Reynal, t. III, p. 612-631.)

Jusqu'à présent on avait désigné sous le nom de maladie les affections diverses qu'on observe chez le chien depuis sa naissance jusqu'après la deuxième dentition.

Cette opinion fautive, et suite d'un défaut d'observation, est combattue dans l'article. On prouve que les maladies de l'enfance chez le chien ont beaucoup d'analogie avec celles de l'enfant, et qu'on doit les classer dans l'ordre suivant :

- a. *Catarrhe bronchique*, débutant par le *catarrhe nasal*, se terminant par la *bronchite capillaire* ou la *pneumonie lobulaire*, compliquée souvent de *conjonctive* et de *kératite*.
- b. *Catarrhe intestinal*, compliqué fréquemment de *stomatite aphtheuse*, se terminant ordinairement par la *dysenterie*, rarement par l'*ictère*.
- c. *Maladies du système nerveux* :
 - Congestion des méninges.
 - Chorée.
 - Paralysie postérieure.
- d. *Maladie éruptive* (*pemphigus* ou *ruppia*).

Ce travail est le fruit de recherches nombreuses, faites pendant douze ans, et

condensées dans un court espace. On peut y puiser de nombreux éléments pour une pathologie comparée des maladies de l'enfance.

2° *Crevasses*; dénomination donnée à une affection très-fréquente de la peau du paturon et du boulet chez le cheval. (*Dictionnaire de médecine vétérinaire*, t. III, p. 553.)

Rapport sur un mémoire de M. Rougieux, concernant la fièvre typhoïde chez le cheval.

Le rapporteur combat, dans ce travail, l'analogie qu'on cherchait à établir entre une maladie du cheval et la fièvre typhoïde de l'homme. (*Recueil de médecine vétérinaire*, 1859, p. 312-320.)

Note lue dans la séance du 24 mars 1859, à la Société centrale de médecine vétérinaire lors de la discussion sur la fièvre typhoïde du cheval. (Recueil de médecine vétérinaire, 1859, p. 435-444.)

Cette note tend à établir qu'on a voulu faire jouer à l'altération du sang, dans ce qu'on appelle les affections typhoïdes du cheval, un rôle qui ne lui revient pas exclusivement; elle combat la généralisation trop absolue qu'on a voulu tirer de certains caractères du sang, mal établis du reste, et dont on attend encore la confirmation. Enfin elle rétablit la part qu'on doit attribuer à un élément inflammatoire, mis de côté dans ces derniers temps, en même temps qu'elle dénote la contradiction qui existe entre la nature soi-disant typhoïde de ces maladies et le traitement préconisé par les partisans de l'altération du sang.

Rapport sur plusieurs mémoires traitant de l'encastelure et du moyen de la guérir. (Recueil de médecine vétérinaire, 1860, p. 59-80.)

Ce rapport, très-étendu, résume les divers travaux et méthodes employés pour combattre l'encastelure ou rétrécissement des parties postérieures du pied chez le cheval; il comprend les causes de cette affection, soit directes, soit indirectes; les nombreux moyens, tels que fers et instruments, inventés pour les guérir, et analyse leurs avantages ou leurs inconvénients; il indique quel est le procédé le plus simple, celui qui donne des résultats persistants, tandis que les autres méthodes,

tout en présentant une amélioration plus rapide, ne produisent pas une guérison durable.

Rapport sur un travail de M. Mottet, intitulé : Inflammation diffuse des régions du métatarse chez le cheval. (Recueil, 1862, p. 398.)

Ce travail tend à établir que la maladie désignée sous le nom d'*Inflammation diffuse des régions du jarret et du métatarse chez le cheval* est une phlébite de la saphène, compliquée d'angioléucite de la face interne de la cuisse.

Des tumeurs épithéliales chez les animaux domestiques et en particulier du cancroïde des lèvres chez le cheval et le chat. (Mémoire lu à l'Académie de médecine dans sa séance du 3 mai 1863.)

Après avoir établi qu'il existe chez les animaux des tumeurs épithéliales qui ont leur lieu d'élection aux lèvres, à la langue, au pénis, au fourreau et à la vulve, le mémoire donne les caractères propres à ce genre de tumeurs, tels que leur mode de propagation et leur composition vue au microscope.

Il renferme une monographie détaillée du cancroïde des lèvres chez le chat et chez le cheval, comprenant les symptômes, la marche et les terminaisons de cette affection; il prouve que ces tumeurs sont bien de nature épithéliale, et renferme des gravures représentant leur apparence d'après l'examen microscopique.

Il se termine par l'indication d'un traitement nouveau par le chlorate de potasse, et cite à l'appui quatre faits de guérison du cancroïde des lèvres chez le cheval et chez le chat.

Examen de nouvelles doctrines sur la rage. (Clinique vétérinaire, 1864, p. 69-76.)

Réponse à M. Decroix sur le même sujet. (Clinique vétérinaire, 1864, p. 159-163.)

Ces deux articles ont pour but de combattre des opinions nouvellement émises sur la rage, et notamment : 1° l'existence d'une rage calme, dont les symptômes sont à peu près nuls et dont la durée serait plus courte que celle de la rage furieuse; 2° la croyance qu'un chien non enragé, sous le coup d'un accès de fureur, puisse communiquer la rage à un animal de son espèce ou à l'homme; 3° le peu d'influence que peut avoir sur le développement de la rage la privation des plaisirs vénériens et la séquestration.

Quelques mots sur ce qu'on appelle encore la fièvre typhoïde du cheval. (Clinique vétérinaire, 1864, p. 163-177, 256-264, 300-311, 502-511 et 545-552.)

Ce travail est la confirmation des idées émises dans la note lue à la Société centrale de médecine vétérinaire dans la séance du 24 mars 1859. Il a pour but d'établir la différence qui existe entre certaines maladies sporadiques et les affections du cheval chez lesquelles il y a vraiment altération du sang; il insiste sur la rareté de ces dernières et sur leur ressemblance avec les affections de nature charbonneuse. Les analyses du sang, qui ont été faites par l'auteur, prouvent la vérité des opinions qu'il a défendues depuis plusieurs années.

Note sur une maladie du cœur chez le chien, lue à la Société centrale de médecine vétérinaire dans sa séance du 12 mai 1864.

Description d'une *endocardite avec insuffisance valvulaire des deux côtés*; épanchement séro-purulent contenu dans les cavités pleurale et péricardique, ramollissement des ganglions pectoraux et bronchiques, épaissement des valvules tricuspide, mitrale et aortale gauche.

Mémoire sur les affections de nature rhumatismale qu'on observe chez les animaux domestiques, lu à l'Académie dans la séance du 5 juillet 1864.

Conclusions du mémoire.

- I. — Chez le cheval il existe trois formes de rhumatisme :
 - 1° Le rhumatisme musculaire, soit aigu, soit chronique;
 - 2° La synovite rhumatismale, complication à peu près constante d'une pleurite ou d'une péricardite;
 - 3° Le rhumatisme articulaire, présentant à l'état aigu une variété bien tranchée.
- II. — Chez le bœuf on n'a observé que les deux formes musculaire et articulaire, avec une variété analogue à l'arthrite des jeunes animaux.
- III. — Chez le porc on ne connaît que le rhumatisme articulaire.
- IV. — Chez le chien le rhumatisme articulaire est la seule forme bien décrite.
- V. — On n'a pas encore observé chez le mouton de maladie ayant le caractère rhumatismal.

Le typhus au Jardin d'acclimatation. (Journal de Lyon, 1865, p. 564.)

Comptes-rendus de la Société centrale de médecine vétérinaire, publiés dans le *Journal de Lyon* pendant l'année 1865.

Rapports sur une poudre résolutive préconisée par M. Vivien. (1^{er} Bulletin de la Société centrale, 1865, p. 128, séance du 12 janvier 1865; 2^{er} Bulletin de la Société centrale, 1866, p. 163, séance du 14 juin 1866.)

Hypertrophie de la prostate chez le chien. (Bulletin de la Société centrale, 1867, p. 51.)

Note sur les affections typhoïdes. (Bulletin de la Société centrale, 1867, p. 205.)

Rapport fait au nom de la commission des récompenses. (Bulletin de la Société centrale, 1867, p. 268.)

Rapport sur une note de M. Trasbot, traitant de la maladie dite typhoïde du cheval. (Bulletin de la Société centrale, 1867, p. 281.)

Rapport général sur le concours des prix de 1866. (Bulletin de la Société centrale, 1867, p. 297.)

Note sur une tumeur de la région sous-lombaire chez le chien. (Bulletin de la Société centrale, 1868, p. 273).

Rapport sur deux notes de M. Staims-Cézard, traitant toutes deux du charbon. (Bulletin de la Société centrale, 1869, p. 196.)

Note sur les affections de nature charbonneuse. (Bulletin de la Société centrale, 1869, p. 201.)

Angine couenneuse chez le chat; présentation de pièce. (Bulletin de la Société centrale, 1869, p. 170.)

Rapport sur une note de M. Pench, intitulée : Coliques produites par la dilatation du gros intestin chez le cheval. (Bulletin de la Société centrale, 1870, p. 71.)

Mémoire sur deux luxations incomplètes des vertèbres cervicales chez le cheval, lu dans la séance du 11 avril 1872 de la Société centrale de médecine vétérinaire.

Note sur une affection eczémateuse de la peau chez le cheval. (Séance du 25 avril 1872 de la Société centrale de médecine vétérinaire.)

ANALYSES CRITIQUES.

JOURNAUX FRANÇAIS.

Revue vétérinaire des années 1856 et 1857 publiée dans les Archives générales de médecine, cahier de novembre 1857.

SOMMAIRE.

Typhus contagieux du gros bétail. — Gale du mouton. — Empoisonnement par la saumure. — Inoculation de la péripneumonie. — Eaux-aux-jambes et vaccine. — Nouvelle théorie sur le vermineux chez le cheval. — Diathèse typhoïde. — Sang de rate. — Maladie du chat simulant la pellagre. — Myosite spontanée du cheval. — Guérison du tétanos par l'administration de l'essence de térébenthine. — Bernie pulmonaire chez la vache. — Traitement de la bernie inguinale par la perforation du sac herniaire. — Onanisme chez le cheval. — Traitement du tétanos par l'acide cyanhydrique et par le chanvre indien. — Ossification du canal cholédoque.

Revue vétérinaire des années 1858-1859-1860, publiée dans les Archives générales de médecine, cahier de juillet 1861.

SOMMAIRE.

Contagion et inoculation de la fièvre aphteuse. — Inoculation préservatrice de la péripneumonie d'après la méthode Willems; ses résultats. — Ce qu'on appelle fièvre typhoïde du cheval. — Traitement des plaies articulaires par l'oxymelle de cuivre. — Torsion du vagin. — Transmission prétendue de la variole de l'homme au chien. — De la nature du sang de rate.

Revue vétérinaire de l'année 1861, publiée dans les Archives générales de médecine, cahier de janvier 1863.

SOMMAIRE.

Question de la morve; nouveau mode de traitement par l'arsénite de strychnine; résultats obtenus tant en France qu'à l'étranger. — Emploi des douches froides contre le farcin. — Inoculation de la péripneumonie; rapport de M. Dummerie à la Société d'agriculture de Belgique; travaux de M. Hering et de M. Verheyen sur le même sujet. — Anémie idiopathique. — De l'oblitération de la veine-porte chez les animaux. — Découverte du pentastème densicostatus dans les ganglions

mésentériques du mouton. — Inoculation du typhus. — Expériences sur l'introduction de l'air dans les veines. — Effets toxiques et emploi thérapeutique de la benzine. — Déchirure ancienne de l'estomac chez le cheval; rupture de l'utérus suivie de guérison (jument). — Introduction dans le oeur des vaches de corps aigus. — Fièvre intermittente observée chez le cheval.

Revue vétérinaire de l'année 1862, publiée dans les Archives générales de médecine, 1863, p. 733-746.

SOMMAIRE.

De la contagion du sang de rate par virus volatil. — Contagion de la morve chronique, de sa curabilité; traitement strychno-arsénical; guérison spontanée. — Variole chevaline. — Opinions diverses sur la consanguinité. — Névrose du bœuf peu connue jusqu'à ce jour. — Inoculation préservatrice du typhus des bêtes bovines. — Du goître chez les animaux domestiques. — Typhus de la moelle épinière du cheval. — Néphrite typhoïde observée sur les solipèdes. — Pourpre hémorrhagique du bœuf. — Oblitération artérielle déterminant une circulation intermittente. — Paralyse intermittente causée par une obstruction incomplète du sinus caverneux.

Revue vétérinaire de l'année 1863, publié dans les Archives générales de médecine, 1864, p. 710.

SOMMAIRE.

De la lithotritie appliquée au cheval. — De l'absorption effective par les vaisseaux lymphatiques. — Sur les effets de l'abstinence et de l'alimentation insuffisante chez les animaux. — Du pissement de sang des moutons. — D'une variété d'hématurie peu connue qui règne dans l'ouest de la France. — De la cachexie ossifrage observée en Allemagne. — Étude sur la fluxion périodique des yeux, sa nature et son traitement. — Preuves expérimentales de la contagion de la morve chronique. — Nouvel insuccès du traitement strychno-arsénical. — De la maladie parasitaire des poulx transmissible aux animaux domestiques. — Du goître observé chez les animaux dans les environs de Genève. — De diverses lésions de l'encéphale. — De la peste bovine; sa transmissibilité à l'espèce ovine. — Ponction du rumen, extraction de corps étrangers du bonnet. — Estription du cornet ethmoïdal du cheval.

Revue vétérinaire des années 1864 et 1865, publiée dans les Archives générales de médecine, 1865, p. 707.

SOMMAIRE.

Marche du typhus épidémique du gros bétail, transmission de la maladie à l'espèce ovine et de cette espèce à l'espèce bovine. — Utilité des règlements de police sanitaire. — Inoculation préventive du typhus et de la péripneumonie épidémique. — Expériences de la commission belge; leur résultat, leur valeur scientifique. — De la paralysie chez le cheval; opinions diverses sur l'importance des lésions des muscles et des nerfs du train postérieur. — De la fièvre aphteuse; des effets funestes produits par l'ingestion du lait provenant de vaches atteintes de cette maladie; sa réapparition chez le même animal. — Complication catarrhale de la fièvre aphteuse. — De la trichinose chez les divers animaux domestiques. — De la torsion du col de l'utérus chez la jument. — Altération du sang dans la maladie du col. — Traitement des plaies granuleuses. — Castration des chevaux cryptorchides. — Le crapaud du cheval causé par un cryptogame. — Études sur l'iverme envivante et d'autres espèces du genre *Iolium*. — Traitement des fièvres pernicieuses par la racine de persil.

Revue vétérinaire de l'année 1866, publiée dans les Archives générales de médecine, 1867, p. 76.

SOMMAIRE.

Marche du typhus contagieux des bêtes bovines en Angleterre, en Hollande et en Belgique; son apparition en Suisse et en Égypte. — Utilité des mesures de police sanitaire. — Origine du typhus. — Non-identité du typhus et de la variole; son peu d'analogie avec le choléra. — Des diverses espèces de variole. — Expériences de la Commission lyonnaise. — Infection de vaccin dans les vaisseaux du cheval et production du *horne-pox*. — Négation de la spontanéité des maladies virulentes. — Réfutation de cette doctrine. — La maladie du coit étudiée en Algérie. — Possibilité d'une guérison radicale. — Des affections entandées contractées par les vétérinaires pratiquant la délivrance chez les femelles domestiques. — Conclusions de la commission nommée par le préfet d'Eure-et-Loir pour étudier le sang de rate. — Prétendue identité des affections dites *typhoïdes* et du charbon. — Nouveaux documents sur la paraplégie du cheval. — Du typhus de la moelle épinière observé en Allemagne; sa coïncidence avec une affection analogue de l'homme. — Expériences sur la transmission de la morve aux carnivores.

Revue vétérinaire de l'année 1867, publiée dans les Archives générales de médecine, 1868, p. 588.

SOMMAIRE.

Discussion sur l'identité de la morve et du frain. — Marche du typhus. — Résumé des essais d'incubation préventive tentés en Russie de 1853 à 1853. — Nouvelles études sur l'infection typhoïde du cheval. — Non-identité de cette maladie et du charbon. — La spontanéité des maladies virulentes. — Opinions diverses des professeurs de l'École de Lyon. — Du traitement de la hernie ombilicale des poulains; emploi des caustiques et du chromate de potasse en particulier. — Avantages de l'opération. — La chavelle observée sur l'espèce bovine. — Recherches expérimentales et cliniques sur l'action de la belladone, de la stramoine et de la jusquiame. — La méthode Willems devant l'Académie de médecine belge. — Maladie éruptive des bêtes bovines nourries avec des résidus de distillerie. — La hernie inguinale interne du bœuf. — Son traitement. — Une affection du mouton produite par des pterospERMIES. — L'anasarque du cheval analogue de la néphrite parenchymateuse aiguë.

Revue vétérinaire de l'année 1868, publiée dans les Archives générales de médecine, 1869, p. 594.

SOMMAIRE.

De la valeur qu'on doit attribuer à la présence des bactéries dans le sang des animaux atteints du charbon, de la morve ou d'autres maladies. — Résultats donnés par l'examen du sang dans les maladies dites *typhoïdes*. — L'activité des virus expliquée par la présence des cryptogames. — De la teigne favuse du chat; contagion de la teigne de l'enfant à cet animal. — De la teigne diffuse du cheval. — Affection entandée causée par la présence de l'oxide fouisseur. — Statistique de la rage; conclusions qu'on en tire; leur examen. — De la mélanose et de la classification des tumeurs mélaniques. — Découverte de la variole du cheval en 1863. — L'exanthème coital du cheval considéré comme étant le *horne-pox*. — Exanthème phlycténolide des bêtes bovines. — Diabète sucré du cheval. — Emphyseme essentiel des solipèdes. — Gangrène intestinale suite d'invagination; expulsion de l'ame invaginée. — Entérite coenueuse; expulsion d'une fusée membrane stimulant une portion d'intestin.

Revue vétérinaire de l'année 1869, publiée dans les Archives générales de médecine, 1870, p. 712.

SOMMAIRE.

Du cornage chronique, de ses causes et d'un nouveau mode opératoire proposé pour sa guérison. — Traitement du charbon par l'acide phénique; résultats heureux et malheureux. — De l'ictère grave du chien; nouveau mode de traitement. — De la spontanéité du cou-par et de sa fréquence. — Plusieurs cas de kystes dentaires du cheval; remarques sur leur fréquence et leur lieu d'élection. — Renversement du rectum chez les jeunes animaux des espèces canine et féline; suture de l'anus en amenant la réduction. — De la teigne du lapin et de la souris; faits de transmission à l'homme. — Recherches sur la contracture des mâchoires dans l'asphyxie par submersion. — Méningite cérébro-spinale enzootique du bœuf.

JOURNAUX ÉTRANGERS.

The Veterinarian or Monthly Journal of veterinary science; 2^e semestre 1854; analyse publiée dans le *Recueil de médecine vétérinaire*, année 1855, p. 708.

The Veterinarian, 1855. (*Recueil*, 1857, p. 45 et 356.)

The Veterinarian, 1^{er} semestre 1856. (*Recueil*, 1857, p. 603.)

Sur l'emploi des matières virulentes de la morue et du farch contre les affections de poitrine et d'autres maladies, par James WILKINSON. (*Recueil*, 1857, p. 648.)

The Veterinarian, 2^e semestre 1856. (*Recueil* 1858, p. 262.)

The Veterinarian, 1^{er} semestre 1858. (*Recueil*, 1858, p. 687.)

The Veterinarian, 2^e semestre 1857. (*Recueil*, 1859, p. 278.)

Edinburg veterinary Review, 1858.

Étude des épidémies au point de vue de la pathologie comparée, par le docteur RICHARDSON. (*Recueil*, 1860, p. 628.)

The Veterinarian, année 1858. (*Recueil*, 1861, p. 52 et 1031.)

The Veterinarian, année 1859. (*Recueil*, 1862, p. 570.)

Edinburg veterinary Review, 1862.

Épidémie de la clavelée en Angleterre. (Clinique vétérinaire, 1862, p. 597.)

Edinburg veterinary Review, année 1860. (*Recueil* 1863, p. 643-651.)

Note sur le typhus en Angleterre; extraite du *Veterinarian*, 1865. (*Journal de Lyon*, 1865, p. 553.)